

**Dr. med. Knut Völke**  
Chirurg - Proktologe

**Dr. med. Katrin Suchan**  
Chirurgin - Proktologin

**Dr. med. Mahtab Doroudi**  
Chirurgin - Visceralchirurgin

Praxis im Ärztehaus der Klinik Maingau  
Eschenheimer Anlage 7, 60316 Frankfurt/ M  
fon (069) 498 00 43 fax (069) 498 00 47  
www.coloproct.de info@coloproct.de

Belegbetten in der Klinik Maingau  
Scheffelstraße 2, 60318 Frankfurt/M  
fon (069) 40331 fax (069) 40331  
www.rotkreuzkliniken.de

## Weitere coloproktologische Erkrankungen

Analthrombose  
Marisken  
Pilonidalsinus, Pilonidal-Abszess  
Condylome  
Inkontinenz  
Reizdarm

Bei einer **ANALTHROMBOSE** handelt es sich um einen harmlosen Bluterguss in einem Blutgefäß am Analrand, der nach festem Auspressen von Stuhl aus dem After auftreten kann.

**MARISKEN** sind Hautfalten, die nach Entzündungen oder als Folge von Hämorrhoiden am Afterrand zurückbleiben können. Eine operative Entfernung der Marisken ist nur erforderlich, wenn sie sich häufig entzünden oder die Reinigung des After erschweren.

Ein **PILONIDALSINUS** ist eine Entzündung der Haut in der Gesäßfalte, hervorgerufen durch in das Unterhautgewebe eingewanderte Haare. Die Entzündung führt zu einer schmerzhaften Schwellung. Es entwickelt sich ein **PILONIDAL-ABSZESS** (Eiterherd), der in einigen Fällen nach außen durchbricht und Eiter entleert. Meist muss der Pilonidal-Abszess operativ eröffnet werden. In der Regel bleibt ein Pilonidalsinus als chronische Fistel zurück. Ein Pilonidalsinus heilt nur vollständig aus, wenn er operativ entfernt wird.

**CONDYLOME** sind Hautwarzen, die nach einer Infektion mit einem Virus entstehen. Condylome verursachen Juckreiz und können anale Blutungen verursachen. Medikamentös lassen sich nur kleine Condylome behandeln. Condylome im Afterkanal und größere Condylome am After müssen operativ entfernt werden. Condylome neigen dazu, auch nach vollständiger Entfernung wieder aufzutreten.

**INKONTINENZ** ist eine Abschwächung des normalen Afterabschlusses. Die Stuhlentleerung kann nicht mehr vollständig kontrolliert werden. Eine Inkontinenz macht sich durch Nässen und verschmutzte Wäsche bemerkbar. Ursachen einer Inkontinenz können vielfältig sein, zum Beispiel Verletzungen der Schließmuskulatur durch eine schwere Geburt oder altersbedingte Veränderungen des Nervensystems.

**REIZDARM** ist eine funktionelle Erkrankung des Dickdarms, die Blähneigung, schmerzhafte Darmkrämpfe, Durchfall und Verstopfung verursacht. Der Grund für die Erkrankung ist bisher nicht bekannt. Einige wissenschaftliche Untersuchungen deuten daraufhin, dass die Reizschwelle des Nervensystems in der Darmwand (intrinsisches Nervensystem) soweit gesenkt ist, dass normale Darmbewegungen nach der Nahrungsaufnahme als schmerzhafte Darmkrämpfe empfunden werden.